

SGLT2 阻害薬		回 /日	正常(mg/日)	軽度	中等度	高度	末期	透析
			(eGFR/CCr)	60	45	30	25	20
ジャディアンス	1	10 - 25 (2型糖尿病)	慎重	慎重	投与しない			
		10 (慢性心不全)			慎重	試験なし		
フォシーガ	1	5 - 10 (1型・2型糖尿病)	慎重	慎重	投与しない			
		10 (慢性心不全)				試験なし		
		10 (慢性腎臓病)			慎重	試験なし		
カナグル	1	100	慎重	慎重	投与しない			
デベルザ	1	20	慎重	慎重	投与しない			
スーグラ	1	50 - 100 (1型・2型糖尿病)	慎重	慎重	投与しない			
ルセフィ	1	2.5 - 5	慎重	慎重	投与しない			
DPP4 阻害薬		回 /日	正常(mg/日)	軽度	中等度	高度	末期	透析
			(eGFR/CCr)	60	50	45	30	15
ジャヌビア	1	50 - 100		25 - 50	12.5 - 25			
グラクティブ								
トラゼンタ	1	5		容量調節なし				
テネリア	1	20 - 40		容量調節なし				
ネシーナ	1	25		12.5	6.25			
エクア	1-2	50 - 100		50 (1日1回)				
スイニー	2	200 - 400			100 (1日1回)			
オングリザ	1	2.5 - 5		2.5				
ザファテック	週1	100 (週1回)		50 (週1回)	25 (週1回)			
マリゼブ	週1	25 (週1回)			12.5 (週1回)			
SGLT2 + DPP4		回 /日	正常(mg/日)	軽度	中等度	高度	末期	透析
			(eGFR/CCr)	60	45	30	15	
トラディアンス AP	1	: トラゼンタ 5 + ジャディアンス 10			投与しない			
BP	1	: トラゼンタ 5 + ジャディアンス 25			投与しない			
カナリア	1	: カナグル 100 + テネリア 20			投与しない			
スージャヌ	1	: スーグラ 50 + ジャヌビア 50			投与しない			

イメグリミン	回/日	正常(mg/日)	軽度		中等度		高度		末期	透析
		(eGFR/CCr)	60	50	45	30	15			
ツイミーグ	2	1000-2000	慎重		推奨しない					
メトホルミン	回/日	正常(mg/日)	軽度		中等度		高度		末期	透析
		(eGFR/CCr)	60	50	45	30	15			
メトグルコ	2-3	500-2250	Max1500		Max750		禁忌			
エクメット LD	2	1錠：エクア 50 + メトホルミン 250					禁忌			
エクメット HD	2	1錠：エクア 50 + メトホルミン 500					禁忌			
メトアナLD	2	1錠：スイニー 100 + メトホルミン 250					禁忌			
メトアナLD	2	1錠：スイニー 100 + メトホルミン 500					禁忌			
イニシンク	1	1錠：ネシーナ 25 + メトホルミン 500					禁忌			
ピオグリタゾン	回/日	正常(mg/日)	軽度		中等度		高度		末期	透析
		(eGFR/CCr)	60	50	45	30	15			
アクトス	1	15-45	慎重		禁忌					
メタクト LD	1	：メトホルミン 500 + アクトス 15					禁忌			
HD	1	：メトホルミン 500 + アクトス 30					禁忌			
リオベル LD	1	：ネシーナ 25 + アクトス 15					禁忌			
HD	1	：ネシーナ 25 + アクトス 30					禁忌			
α-GI	回/日	正常(mg/日)	軽度		中等度		高度		末期	透析
		(eGFR/CCr)	60	50	45	30	15			
ベイスン (ボグリボース)	3	1回 0.2 - 0.3							慎重	
セイブル (ミグリトール)	3	1回 50 - 75							慎重	
グルコバイ (アカルボース)	3	1回 50 - 100							慎重	
グリニド	回/日	正常(mg/日)	軽度		中等度		高度		末期	透析
		(eGFR/CCr)	60	50	45	30	15			
ファステック (ナテグリニド)	3	1回 90 - 120	慎重		慎重		禁忌			
グルファスト (ミチグリニド)	3	1回 10	慎重 (1回 2.5 - 10)							
シュアポスト (レバグリニド)	3	1回 0.25 - 1	慎重							
グルベス	3	1錠：グルファスト 10 + ベイスン 0.3								
SU	回/日	正常(mg/日)	軽度		中等度		高度		末期	透析
		(eGFR/CCr)	60	50	45	30	15			
アマリール (グリメピリド)	1-2	0.5 - 6	慎重		禁忌					

経口GLP-1	回	正常(/日)	軽度	中等度	高度	末期	透析	
	/日	(eGFR/CCr)	60	45	30	15		
リベルサス	1	3, 7, 14 mg						
注射GLP-1	回	正常(/日)	軽度	中等度	高度	末期	透析	
	/日	(eGFR/CCr)	60	45	30	15		
ビクトーザ	1	0.3 - 1.8 mg						
リクスミア	1	10 - 20 μ g				慎重		
バイエッタ	2	1回 5 - 10 μ g	慎重	慎重	禁忌			
週1回 注射GLP-1	回	正常(/日)	軽度	中等度	高度	末期	透析	
	/日	(eGFR/CCr)	60	45	30	15		
オゼンピック	週1	週1回 0.25 - 1						
ウゴービ		週1回 0.25 - 2.4						
トルリシティ	週1	週1回 0.75						
週1回 GLP-1/GIP	回	正常(/日)	軽度	中等度	高度	末期	透析	
	/日	(eGFR/CCr)	60	45	30	15		
マンジャロ	週1	週1回 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15				慎重/データ不足		
GLP-1 + インスリン	回	正常(/日)	軽度	中等度	高度	末期	透析	
	/日	(eGFR/CCr)	60	45	30	15		
ゾルトファイ	1ドーズ：トレシーバ 1 + ビクトーザ 0.036 mg							
ソリクア	1ドーズ：グラルギン 1 + リクスミア 1 μ g				慎重			